ливался на основании дополнительного анамнеза, результатов риноскопии, аллергообследования, определения эозинофилов в назальном секрете, общих IgE сыворотки крови. Всего обработано 2250 карт. Из числа опрошенных симптомы аллергического ринита отмечены у 117 детей (5,2%), данные официальной статистики 0,5%, из них 28,2% отмечают ухудшение качества жизни. Поллиноз отмечен только у 2%, у остальных клиника соответствовала круглогодичному АР. Диагноз АР стоял только у 16,2% детей у этой группы, это отражает проблему гиподиагностики АР. Сопутсвующие АР поражение слизистых глаз было отмечено у 35,9% обследованных.

Таким образом, проблема гиподиагностики актуальна для заболеваний верхних дыхательных путей, что диктует необходимость разработки комплексных мер.

EPIDEMIOLOGY OF ALLERGIC R HINITS IN PUPILS OF THE REPUBLIC SAKHA(YAKUTIA)

Ivanova O.N.,Kondurina E.G.,
Petrova. P.G.,Barashkova N.N.
Medical Institute of Yakutsk State University, Yakutsk

Statement of international consensus in therapeutic treatment of allergic rhinitis is new understanding of atopics becouse main bit of her development is allergic chronicl reactions. The problem of allergic rhinitis diseases in children is quite acute at present time. Nowadays the problem of allergic diseases with children is very actual. Pediatricians intent attention to this problem is explained by the prevalence of allergic diseases, by the evolution of acute allergic conditions with children, which demand a first therapeutic aid, by essential influence of allergic reaction to the flow of the other ..

The research was carried out by us within the framework of the programm “ISAAK – 2” . The programm “ISAAK – 2”includes the extension of questionnaire about 3 studying allergic diseases, the study of demographic description and deepened estimation of risk’s factor. Except questioning we have examined rhin, performed prick- testing,definition of immunoglobuline E,freezing of blood serum for future analysis. We examined and interrogated 2250 children of school age of Repablic Sakha.

According to our researcher number of cases of allergic rhinitis is 5.2 %/According to the statistical dates number of cases of allergic rhinitis in Republica Sakha kvaries from 0.5%.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВЕНИЙ

Кильдебекова Р.Н., Перепечаева Т.А.
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа

Эффективность лечебно–профилактических программ в значительной степени определяется участием в них населения. Психологическая неготовность к обследованиям и недостаточная активность в реализации врачебных рекомендаций снижают потенциальную эффективность планируемых мероприятий и делают актуальным поиск факторов, влияющих на участие в исследованиях (Фомина Р.Ф. с соавт. 1999).

Цель. Оценить прогностическую значимость факторов, влияющих на выполнение немедикаментозных рекомендаций врача по профилактике.

Материалы и методы. Исследование является эпидемиологическим обследованием неорганизованной мужской популяции трудоспособного возраста г. Магнитогорска. Методом случайной выборки обследовано 1125 мужчин в возрасте 20-59 лет, что составило 94% от списочного состава (средний возраст 41,2±2,3 лет). Обследование проводилось на базе поликлиники №2 городской больницы №3 г. Магнитогорска, по стандартному опроснику (Rose G.A., Blackburn H., 1982), адаптированным ГНПК РФ.

Была набрана когорта численностью 142 человека, страдающих артериальной гипертензией (АГ) I-II степени. Для оценки интегрального воздействия и удельного веса конкретных факторов риска (осведомленность о наличии АГ, курение, уровень образования, гиперхолестеринемия, возраст, семейное положение, обогащенная наследственность, прием алкоголя, сниженная физическая активность, избыточная масса тела), прогнозирующих выполнение рекомендаций, мы использовали многофакторный анализ.

Результаты. Анализ показывает, что значительная часть обследованных не готова к профилактическим воздействиям, что наиболее четко проявляется в отношении рекомендаций немедикаментозного характера – почти половина обследованных 66 человек (46,8%) не выполняют их.

Более привычен и приемлем для обследованных прием лекарственных средств, поэтому отказов от рекомендаций немедикаментозного характера значительно меньше – 28 (19,7%).

Выполнение рекомендаций немедикаментозного типа в значительной степени определяется поведенческими и социальными факторами. Из анализируемых факторов статистически достоверными оказались осведомленность о наличии АГ, курение, уровень образования, гиперхолестеринемия, удельный вес которых в сумме равен 78%. Вклад отдельных факторов риска в общий прогноз составил: осведомленность о наличии АГ – 32%, курение – 29%, образование – 9%, гиперхолестеринемия – 8%, на долю оставшихся факторов риска приходится 22%.