

*Приоритетные направления науки, техники и технологий***СОСТОЯНИЕ ПРООКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ КРОВИ У БОЛЬНЫХ РОЖЕЙ НА ПРИМЕРЕ МАЛОНОВОГО ДИАЛЬДЕГИДА**

Афашагова М.М., Ахохова А.В.
 Кабардино-Балкарский
 государственный университет,
 Нальчик

Проведено исследование свободнорадикального перекисного окисления липидов на примере малонового диальдегида (МДА) у больных рожей. Последний накапливается в крови при синдроме интоксикации. При высоком содержании антиоксидантов в организме образуется лишь небольшое количество продуктов свободнорадикального окисления, участвующих в регуляции многих физиологических процессов. Уменьшение же содержания антиоксидантов в тканях приводит к тому, что продукты (ПОЛ) начинают производить вместо физиологического патологический эффект.

Целью работы явилось изучение состояния прооксидантной системы крови у больных рожей в зависимости от периода заболевания и степени тяжести патологического процесса.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 47 больных рожей от 40 до 72 лет. Из них у 12 человек заболевание протекало в легкой форме, у 31-в среднетяжелой и у 4 обследуемых в тяжелой форме. У большинства больных патологический процесс протекал в эритематозной форме с преимущественным поражением нижних конечностей. Кровь больных обследована в периоде разгара заболевания, угасания клинических симптомов и ранней реконвалесценции.

Результаты и обсуждения. В процессе заболевания рожей отмечено достоверное повышение уровня МДА, с максимальным значением, в периоде разгара заболевания ($3,7 \pm 0,08$), особенно при тяжелом течении процесса. В период угасания клинических симптомов, параллельно положительной динамике заболевания, наблюдалось постепенное снижение уровня активности показателя ($2,5 \pm 0,07$), приходящего к норме в период ранней реконвалесценции ($1,4 \pm 0,08$). Изучение уровня МДА у больных рожей в зависимости от тяжести заболевания выявило более значительное возрастание МДА при среднетяжелой и тяжелой формах заболевания. Уровень изучаемого показателя возвращался к норме в период ранней реконвалесценции при легком течении и оставался достоверно выше нормы при тяжелом и среднетяжелом течении.

Таким образом, в результате проведенных исследований обнаружена зависимость уровня МДА от периода и степени тяжести патологического процесса при роже. При этом не происходит возвращения изучаемого показателя к норме в периоде ранней реконвалесценции, у больных с тяжелой и среднетяжелой формой рожжи, что свидетельствовало о не завершенности патологического процесса в этом периоде у наблюдавшихся больных. Полученные данные о закономерностях изменения уровня малонового диальдегида у больных рожей, по-видимому, свидетельст-

вует о важной роли процессов перекисного окисления липидов в патогенезе этого заболевания.

STATISTICAL DESCRIPTION OF CONTROL SYSTEMS IN NANOLITHOGRAPHY

Borisenok S.V.
 Herzen State Pedagogical University,
 St. Petersburg

Here we present the application of control methods to nanotechnology. This special technology is used in mastering of real objects with the space sizes of few nanometers. It allows operate with such objects for the purposes of the modern technology, for example, in the field of nanolithography, then the beam of cooled atoms passing through standing laser wave(s) to be concentrated on the so-called "mask". In this sense the method itself is very similar to ordinary lithography but with the opportunity to get nano-scale of the objects (microchips etc.).

Every atomic beam in nanolithography consists of many quantum particles, and for every atom from the beam we have the second order ODE based on the Schroedinger equation. The coefficients of this equation depend on the laser field (consisted actually of two fields: basic and additional modulated). Because of the field modulation they are changed and they are time-dependent, it influences on the atomic dynamics, and we get the opportunity to realize a feedback, i.e. to express the process in the terms of control theory and to apply control methods to the dynamical differential equations. Here the input is the beam characteristics and the output is the space distributions of the particles on the mask.

Standard speed gradient method, however, is not very productive in nanotechnology. From one side, it allows achieve the selected level of *energy* (the eigenfunction of Hamiltonian for dynamical differential equation). But for the practical purposes of nanolithography we need to prepare an atomic beam with the very narrow *spatial* distribution. Thus, it is logical to include the parameters of the desired distribution in the goal function of the control process. For this purpose we have to re-formulate the mathematical task and introduce the new type of controlled systems. We demand the achievement of the narrow *spatial* distribution of the dynamical particles as the main goal of the control. Additionally we investigate the *statistical* properties of the particle dynamics but not the behavior of the single particle. Statistical approach is very natural if we discuss the dynamical properties of a quantum system, but this problem was not formulated in the frame of classical control theory of real systems. At present only separate cases of atomic beam dynamics are investigated.

Let's sum up our main results:

1. The statistical description of the system (the ensemble of N particles) is realized.
2. The closed control equation for proportional speed gradient feedback is presented.
3. The possibility of statistical control application to the purposes of quantum beam focusing is demonstrated.

Thus, the statistical scheme can be successfully applied in the models of quantum beam control.

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ - СК: ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПАТЕНТЫ, ФИРМЫ

Боровская Т.А.
Саратов

К настоящему времени уже выявлено более трёхсот изобретений, запатентованных только в России как отечественными, так и зарубежными **заявителями**. Среди них есть и **юридические лица** – крупные

медицинские центры, университеты и другие учреждения как зарубежных стран США(US)*, Германия(DE)*, Франции(FR)*, Испании(ES)*, Дании(DK)* и др., так и России(RU)* и **физические лица**, в том числе среди последних - авторы из разных стран. Поскольку в настоящее время СК рассматриваются как универсальный строительный материал, из которого можно сформировать любые клетки организма, информационная актуальность изобретений высока. Фрагмент одной из таблиц патентного обзора даёт некоторые представления о тематических направлениях патентуемых достижений за последние 30 лет в этой области (табл.1).

Таблица 1. Запатентованные изобретения

Дата публ.	Название изобретений
20.07.1976	Способ выявления стволовых кроветворных клеток костного мозга
26.12.1977	Стимулятор миграции стволовых клеток костного мозга
	Способ определения стволовых лимфоидных клеток на гистологическом препарате
	Раствор для замораживания мозга
15.08.1994	Способ восстановления стволовой кроветворной клетки облучённых животных
27.01.1995	Способ ингибирования пролиферации стволовых кроветворных клеток костного мозга
20.09.1996	Сп-б получения костномозгового ингибитора пролиферации стволовых кроветворных кл-к (2 изобр.)
27.09.1996	Способ лечения больных с ожогами
20.03.1997	Гомологические факторы и нейрональные стволовые клетки
20.09.1999	Лекарственный препарат иммунозамещающего действия на основе клеточной суспензии...
20.02.1999	Лекарств. преп-т иммунокорректирующего действ. на осн. клет. суспензии и сп-б лечения сах. диабета
27.06	Устройство для замораживания и хранения клеток ткани
10.12.2000	Способ приготовления клеточного трансплантата из фетальных тканей
27.03.2002	Способ повышения уровней стволовых клеток в периферической крови
27.07.2002	Нейротрансплантация с использованием плюрипотентных нейроэпителиальных клеток
10.08.2002	Ингибитор пролиферации стволовых клеток и его использование
20.10.2002	Культура нервных стволовых клеток, Биотрансплантат для аллопересадки и сп-б его приготовления
10.11.2003	Способ получения недифференцированной клетки
20.11.2003	Трансплантация гемопоэтических клеток
27.03.2004	Способ лечения людей эмбриональными клеточными суспензиями
20.05.2005	Способ выделения мезенхимальных стволовых клеток
20.03.2005	Композиция и способ увеличения количества стволовых клеток...
	Способ имплантации стволовых клеток в миокард в эксперименте
	Композиции и способы доставки генетического материала
	Сп-б получ. клонированных эмбрионов человека путём прим. сп-ба межвидовой трансплантации ядер

Предполагалось, что **есть риск превращения СК, извлечённых из зародышей, в раковые**. Они могут формировать у тех, кому вводятся, агрессивную форму рака – тератому. В последнее время, в результате опубликованных работ коллективов испанских и датских учёных, внёсших серьёзный вклад в науку относительно безопасности **взрослых СК, извлечённых, например, из спинного мозга**, представления специалистов расширились. «Терапия, основанная на размножении малого количества клеток во многих поколениях или с использованием клеток, хранящихся долгое время в банках СК, уже созданных во многих странах, не может считаться безопасной». Испанские учёные предполагают, что предел безопасных делений клеток – 60 генераций. Прежде, чем начнётся широкое использование СК в медицине, необходимо

ещё и ещё изучение их безопасности, изучение всех сторон проблемы СК. Высокая коммерческая стоимость **клеточных технологий** толкает некоторых пользователей гораздо раньше, чем завершаются НИР по их изучению, на использование их для лечения больных. Вокруг некоторых из них много спекуляций и нарушений. В США существует запрет на использование эмбриональных СК. Есть страны, в том числе и Россия, где без должной апробации и разрешительных документов (в частности лицензий) «омолаживать» клиентов пытаются не только в клиниках, но и в косметических салонах. Практическое применение методов, в том числе, **использование новых клеточных технологий** возможно только после их официальной государственной регистрации, лицензирования, которые проводятся Росздравнадзором. Исключение со-