вых парамеций в опытной и контрольной пробах, а также в их размере являлось критерием токсичности или экологически благоприятной среды для одноклеточного организма.

Сироп родиолы розовой с каркаде и шиповником внедрен в производство ООО «Тонекс – продукт» (г. Прохладный, Кабардино-Балкария).

ЗНАЧИМОСТЬ ТЕРАПИИ ФОНОВЫМ РЕЗОНАНСНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ОПИСТОРХОЗЕ

Тен В.П., Ким Л.С., Амбага М.,
Соктоева Ж.Г., Хашаев З.Х., Туталаг Ц., Хайдаев П.
Всемирный Информационно-Распределенный Университет, Москва,
Международная Академия Интеграции Восточной и Западной Медицины (Монголия – Улан-Батор)

Аппарат RDX-терапии «Стела-1» обладает эффектом памяти и уникальной способностью в тоновом режиме фотографировать патологический процесс, т.е. электромагнитное излучение заболевшего органа человека, его профильных выделений и патогенного микроорганизма. Эти же частоты вводятся в контакт с человеком при помощи специального излучателя – аппликатора. При этом происходит коррекция организма путем последовательного, принудительного изменения энергетических характеристик зараженных клеток, болезнетворных микроорганизмов, что приводит к их угнетению и уничтожению.

Приводим наблюдение над пациентом с хроническим описторхозом, который жаловался к моменту обращения на боли в области эпигастрий, правого подреберья, увеличение печени, наличие симптомов панкреатита, холецистита. В дуоденальном содержимом и испражнениях обнаружены яйца паразита, а в анализах крови - эозинофилия и признаки анемии.

Чистка организма от гельминтов – трематод осуществлялась в амбулаторных условиях и заключалась в следующем:

- С помощью съемных шумовых излучателей – аппликаторов, способных формировать спектральный анализ внешнего биологически активного КВЧ – излучения, записана информация с этнотропных лекарственных препаратов (празиквантел и хлоксил), а затем приложены к кровотоку, проекции обитания гельминтов-трематод (печень, желчный пузырь, панкреас) сроком до 12 дней;

- Снята информация с этнотропных лекарственных препаратов (празиквантел, хлосил) и заряжена этим излучением чистая структурированная вода, которая назначена пациенту сроком до 12 дней;

- Снята информация с профильных выделений (кал, дуоденальное содержание, моча) и заряжена этим излучением чистая структурированная вода. Получен собственный лекарственный источник (антигельминтное средство) для дегельминтизации организма, который получал больной в течение трех недель;

- Записана информация с крови путем установления излучателя-аппликатора на кровоток. При этом излучатель-апликатор остается на месте кровотока и перезаряжать его в первый день приходилось через каждый час, а затем 3 раза в день сроком до 12 дней.

Цикл очищения организма об гельминтов-трематов длился три недели. После трехнедельной очистки организма исследование дуоденального содержимого и кала на выявило наличие яиц паразита. Клинически наблюдалась полная регрессия выше перечисленных симптомов.

Таким образом, использование антигельминтных средств, полученных на основе этнотропных лекарств и в большей степени на основе использования самого описторхиса в профильных выделениях пациента, оказывает повреждающее и губительное действие на половозрелых марит, что позволяет рекомендовать ФРИ – терапию для безмедикаментозной дегельминтизации организма при хроническом описторхозе.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕХАНИЗМЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ПРАКТИЧЕСКОМ ПРИМЕНЕНИИ ОРГАННЫХ ПРЕПАРАТОВ В КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ

Тен В.П., Ребриков И.В., Рымарёва О.Н.,
Отгончимэг Д., Хурэлбаатар Л.,
Туталаг Ц., Хайдав П., Хашаев З.Х-М.
Международная Академия Интеграции Восточной и Западной Медицины, Улан-Батор, Монголия;
Институт проблем передачи информации РАН, Москва

Органные препараты - группа препаратов, применяемых в первую очередь при дисфункциях, недостаточности функции и дегенеративных поражениях, которая содержит все компоненты тканей соответствующего органа, наряду с дифференцированными клеточными компонентами (например: клетки различных участков головного и спинного мозга, клетки тимуса, печени и т.д.), может рассматриваться в качестве Simile, подобия к гомологичным человеческим органам. Предполагается, что действие этой группы препаратов заключается в поддержке деятельности гомологичного человеческого органа при его слабости или дисфункции. Различные направления действия уже выявлены и объяснены в ходе иммунологических исследований. Эти препараты используются для поддержки деятельности различных органов и систем при определенных заболеваниях. Как правило, органные препараты (ОП) применяются в рамках комплексной схемы лечения. Основным механизмом воздействия ОП является регуляторный эффект при функциональной недостаточности и дисфункции гомологического органа. Особую область показаний для ОП представляют аутоиммунные заболевания. В качестве механизма воздействия при данной группе показаний рассматривают образование антифакторов, направленных против патологических аутоантител или элиминация обломков клеток и молекул, которые и являются причиной образования аутоантител, вызывающих развитие патологии. Введение ОП, в том числе в потенцированной форме, когда в них еще имеются молекулы исходного вещества, воздействует как комплексная смесь антигенов, вызывающая различные иммунологические реакции. Иммунные ком-